

Influensavirus A og B

Analysemetode

PCR, egenprodusert.

Reserveprosedyre: Xpert Flu/RSV XC, Cepheid (Nyttast når hovudanalyse ikkje er tilgjengeleg, prøveresultat vert verifisert med hovudanalyse i etterkant).

Indikasjon

Mistenkt influensa. Innan 2 veker etter symptomdebut

Prøvetaking

Sekret frå nasofarynks (evt hals). Sjå [Prøvetaking luftvegar til PCR](#)

Prøvetakingsutstyr

Σ-VCM transportmedium, 2 ml (Sigma-VCM):



Oppbevaring før transport

I kjøleskap.

Haldbarheit

4 døgn. Eldre prøvar vurderast.

Vurdering i laboratoriet

Påviser RNA frå influensa A (H1N1 - «svineinfluensa» - inngår her) og influensa B.

Forventa analysetid

Analysen blir utført 2-5 gonger i veka (sesong-avhengig).

Feilkjelder

Utførast av

Molekylærbiologisk fagområde

Fagområde

Virologi

Rekvisisjonsskjema

Skjema HF 1084

Skjema HF 1088

Medisinsk fagleg ansvarleg

Reidar Hjetland

Sist oppdatert

16.10.2018 Karina Astrup