



HELSE FØRDE

Mikrobiologisk avdeling

Førde sentralsjukehus, Helse Førde

Telefon: 57 83 93 47, Fax: 57 83 90 91

Opningstider: 08.00 - 15.00 (14.00)

HPR-nummer:

Rekvirent:

Adresse:

Postnr./stad:

Tlf. nr.:

Evt. kopi til:

Adresse:

Pasient:

Fødselsnr. (11 siffer):

Etternamn:

Fornamn:

Postnr.:

 Kvinne Mann Poliklinikk Innlagt

Problemstilling: *Manglar kliniske eller anamnetiske opplysningar, utførast kun standardundersøking.*

Oppgje antimikrobiell terapi

 Planleggast..... Pågåande..... Avslutta.....

Prøvetakingsdato:..... Prøvetakingsklokkeslett:.....

URIN til bakteriologisk undersøking

- Midtstråle Urin med borsyre
 Eingangskateter Urin, dyppekultur
 Permanent kateter
 Blærepunktat
 Poseprøve, born
 Bakteriologisk dyrking Legionellaantigen
 Pneumokokkantigen

LUFTVEGSPRØVAR

- Augesekret
 Øyresekret
 Nasopharynxsekret
 Halssekret
 Ekspektorat
 Trachealsekret
 BAL
 Anna materiale:.....
 Influenzavirus A/B PCR
 Respiratorisk syncytialt virus (RSV) PCR
 Parainfluenzavirus 1-3 PCR
 Rhinovirus PCR
 Bordetella pertussis PCR
 Mycoplasma pneumoniae PCR
 Chlamydia pneumoniae PCR
 Bakteriologisk dyrking

AVFØRINGSPRØVAR

- Diaréframkallande agens PCR
 (bakteriar/virus/parasittar)
 Clostridium difficile PCR
 Andre analysar (sjå baksida).....

SPINALVÆSKER

- Bakteriologisk dyrking
 Nevroborreliose, hugs serumprøve
 HSV/VZV/Enterovirus PCR

BLODKULTUR

- Bakteriologisk dyrking
 Soppdyrking

EDTA-BLOD

- Malaria
 Denguevirus hurtigtest

ANNA PRØVEMATERIALE

- Lokalisasjon:.....
 Abscessinnhald Bursavæske
 CVK-spiss Cysteinnhald
 Leddvæske Morsmjølk
 Operasjonssårsekret
 Peroperativ
 Postoperativ
 Pleuravæske
 Sårsekret, puss, prøve frå hud
 Anna materiale:.....
 Bakteriologisk dyrking
 Anna undersøking:.....
 Sekret Augesekret
 Herpes simplex virus 1 og 2 (HSV) PCR
 Varicella zoster virus (VZV) PCR
 Enterovirus PCR
 Adenovirus PCR
 Chlamydia trachomatis PCR

SEKSUELT OVERFØRBARE SJUKDOMMAR

- Cervixsekret Urethrasekret Urin
 Vaginalsekret Anna:.....
 Gonokokk/Chlamydia PCR
 Chlamydia PCR
 Genital Herpes PCR (ikkje urinprøvar)
 Gonokokk-dyrking (ikkje urinprøvar)

GENITALPRØVAR

- Cervixsekret Urethrasekret
 Anna materiale:.....
 Bakteriologisk dyrking
 Gjærsopp

TUBERKULOSE-MIKROSKOPI

- Ekspektorat
 Anna materiale:.....

SCREENING-UNDERSØKINGAR, ANTIBIOTIKA RESISTENS

- MRSA-dyrking MRSA hurtigtest
 Nasebor
 Svelg/Tonsillar
 Perineum
 Anna materiale:.....
 VRE
 Rectum/Feces
 ESBL
 Rectum/Feces

SERUM TIL PÅVISNING AV ANTISTOFF/ANTIGEN

- Borrelia burgdorferi
 Syfilis
 Yersinia enterocolitica O3
 Quantiferon-TB (IGRA-TB)
 EBV/Mononukleose hurtigtest

- anti-CMV IgG/IgM
 anti-HAV Total/IgM

SVANGERSKAPSANALYSAR

- Standard: Syfilis, HIV, HBsAg/anti-HBcore
 Ved usikker immunitet: Inkludert Rubella IgG

- HIV antigen/antistoff
 HBsAg/anti-HBcore
 anti-HBs (vaksinekontroll)
 anti-HCV

 Laboratoriet kan velje undersøking på grunnlag av rekvisisjonsopplysningar. Kryss her dersom rekvirenten ikkje godtek dette

Rekvirerande lege:.....

PRØVETAKING OG SENDING AV PRØVAR

Sjå nærare opplysningar på våre internettsider, www.helseforde.no: Laboratoria ➔ Brukarhandbok Mikrobiologisk avdeling.

Revirent/avdeling må oppgjevast. Ved ukjent revirent vert prøvesvaret oppbevart i laboratoriet til det vert etterlyst. Prøvetakingsdato og klokkeslett må fyllast ut. Vi ber om at prøvar til analysar som ikkje utførast hos oss, vert sendt direkte til aktuelle laboratorium.

URIN til bakteriologisk undersøking: Midtstråleprøve. Prøverøyr med borsyre fyllast til streken med urin. Ved lite urin: Sjå *Urinprøvar* på våre internettsider. Dyppekultur kan og nyttast.

LUFTVEGSPRØVAR: Bakteriologisk dyrking: Bakteriologisk transportmedium med pensel, eller sterilt prøverøyr ved aspirat. PCR-undersøkingar: Sekret frå nasofarynks: 2 ml Σ -VCM kit.

AUGEPRØVAR: Bakteriologisk dyrking og gonokokkdyrking: Bakteriologisk transportmedium med pensel. PCR-undersøkingar: Sekret: eNAT.

AVFØRINGSPRØVAR:

Diaréframkallande agens PCR (bakteriar, virus og parasittar): Cary Blair transportmedium.
Clostridium difficile: Både prøverøyr utan tilsetjing (minimum 1 prøveskei) og Cary Blair transportmedium.

Diaréframkallande agens PCR: Inkluderer tarmpatogene bakteriar (Campylobacter, Salmonella, Shigella/EIEC, Yersinia enterocolitica og EHEC). Virus (norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus, sapovirus) og parasittar (Giardia, cryptosporidiar og Entamoeba histolytica).

Clostridium difficile: Indikasjon: Mistanke om antibiotikaindisert diaré og/eller pseudomembranøs colitt.

Andre opplysningar:

Parasitt-mikroskopi (egg og cyster): Dette er ei tids- og ressurskrevjande analyse. Gode kliniske opplysningar må difor påførast rekvisisjonen. Avføring utan tilsetjing. For indikasjonar, sjå brukarhandboka.

Barnemark/Tape-preparat: Sjå brukarhandboka.

SPINALVÆSKER: Bakteriologisk dyrking: Takast på sterile prøverøyr. Oppbevarast i romtemperatur, leverast laboratoriet omgåande. Spinalvæske til PCR: Sendast på 2 ml NUNC-røyr, minimum 0,5 ml prøve. Oppbevarast i kjøleskap. Lærdal og Nordfjordeid: Sjå *Spinalvæske* på våre internettsider.

BLODKULTUR: 2 flasker x 2 er vanleg. Setjast i blodkulturinstrument etter prøvotaking.

EDTA-BLOD: Til Denguevirus-undersøkinga kan serum og plasma også nyttast.

ANNA PRØVEMATERIALE: Større prøvemengder (leddvæsker, abscessmateriale o.l.): Aspirert prøvemateriale overført til sterilt prøverøyr. Mindre prøvemengder: Bakteriologisk transportmedium med pensel. PCR-undersøkingar: Sekret, augesekret: eNAT.

SEKSUELT OVERFØRBARE SJUKDOMMAR: PCR-undersøkingar: Chlamydia/Gonokokk PCR. Urin: Førstestråleprøve, 2 ml urin overførast til eNAT rør. Sekret: Pensel i eNAT rør. Gonokokk-dyrking: Bakteriologisk transportmedium med pensel.

GENITALPRØVAR: Bakteriologisk dyrking, gjærsopp. Bakteriologisk transportmedium med pensel.

TUBERKULOSE-MIKROSKOPI: Ekspektorat eller BAL på sterilt prøverøyr. Oppbevarast i kjøleskap. Prøvar til dyrking/PCR sendast Haukeland Universitetssjukehus.

SCREENINGUNDERSØKINGAR:

MRSA-dyrking: Bakteriologisk transportmedium med pensel.

MRSA hurtigtest: e-Swab. MRSA-PCR hurtigtest er kun for inneliggande pasientar for avklaring av isoleringstilhøve.

Sjå "MRSA-veilederen" til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no), og MRSA-screening og MRSA-PCR for inneliggande pasientar på våre internettsider.

VRE: Rektalprøve. Bakteriologisk transportmedium med pensel.

ESBL: Rektalprøve. Bakteriologisk transportmedium med pensel.

SERUM TIL PÅVISNING AV ANTISTOFF/ANTIGEN

Sentrifugert gelglas med minst 3 ml serum (raud kork med gul stripe). Alternativt er rikeleg (minst 3 ml) avpipetert serum. Unngå å sende fullblodsglas utan gel.

Quantiferon-TB (IGRA-TB): Spesialglas, plasma. Sjå våre internettsider.