

NSAID injeksjon i ambulansane

Ambulansetenesta i Helse Førde og resten av Helse Vest ynskjer å kunne tilby NSAID, spesielt mtp pasienter med steinproblematikk. Alle ambulanser i Helse Førde er no utrusta med denne medisinen. Her er tiltakskortet som ligg i metodeboka til ambulansen. Håper dette blir tatt vel i mot i legevaktsgruppa.

Ketorolac (Toradol) #11541 ABONNERT

Tiltakskort

Grunnlagsinformasjon

Informasjon om kortet

Vedlegg

Logg

Lenker i kortet

Medikamentform

Toradol inj 30 mg/ml, ampulle á 1 ml.

Indikasjon:

- Galle/nyre/ureter stein smerter

Virkemåte:

- Ikke steroid antiinflammatorisk og antirevmatisk legemiddel

Dosering:

- 15 mg dypt intramuskulært eller intravenøst. Kan gjentas en gang etter 20 min.
- Hvis pasienten har tatt egne NSAID's (f.eks. Voltaren) innfor 4 timer, kontakt lege for dosering.

Kontraindikasjon:

- Kjent allergi (overfølsomhet) for NSAID's (f.eks. Ibux, Voltaren, Naproxen).
- Blødning, mistanke om blødning
- Aktivt magesår
- Graviditet, fødsel og amming

Forsiktighetsregler:

- Konferer lege ved:
 - astma
 - nyresvikt
 - sykdom i mage/tarmkanal
 - eldre over 70 år
 - bruk av blodfortynnende medikamenter

Bivirkninger:

- Ingen vesentlige ved engangsdoser
 - Kvalme, oppkast, flatulens, sure oppstøt, diare

Trond Aamot
415 30515
Fagutvikler ambulanse, anestesisjukepleier.
Helse Førde